

Koloidní stříbro – příklady použití, vhodné koncentrace a dávkování

Témata:

[Afty](#) | [Akné](#) | [Angína](#) | [Artritida](#) | [ASLO](#) | [Atopický ekzém](#) | [Bércový vřed](#) | [Borelióza](#) | [Bronchitida](#) | [Crohnova nemoc](#) | [Deodorant / Antiperspirant](#) | [Desinfekce vody](#) | [Chlamydie](#) | [Chronická obstrukční plicní nemoc](#) | [Chřipka](#) | [Inhalace](#) | [Juvenilní idiopatická artritida](#) | [Klystýr](#) | [Lupénka](#) | [Molusky](#) | [MRSA](#) | [Mykózy](#) | [Oční kapky](#) | [Pásový opar](#) | [Růže – Rosacea – Růžovka – Erysipel](#) | [Seborea](#) | [Ústní hygiena](#) | [Záněty horních cest dýchacích](#) | [Záněty močového měchýře](#) | [Záněty vaginální](#) | [Zápach nohou](#) | [Zlatý stafylokok](#) | [20 denní kúra](#) | [Příklady dalšího použití](#)

akné a problematická pokožka – 10 + 20 ppm

Vysoká schopnost koloidního stříbra působit proti bakteriálním nákazám způsobující záněty, jej předurčuje pro ošetření pleti postižené akné, zánětlivými vyrážkami, ekzémy a podobně. Výrazně omezuje jejich výskyt a pomáhá předcházet jejich další tvorbě.

Ráno a večer před spaním vyčistěte důkladně pokožku a osušte. Naneste koloidní stříbro o koncentraci 20 ppm (sprejem nebo použitím vatového tampónu) přímo na postiženou oblast. Nechte zaschnout.

Účinnost tohoto zevního ošetření lze podpořit perorální aplikací koloidního stříbra v koncentraci 10 ppm, v dávce až 3 x denně á 10 ml. Poté, co se kůže od akné vyčistí, můžete užívat jako udržovací dávku 10 ml koloidního stříbra perorálně jednou denně ještě dalších 14 dnů.

Angína + nachlazení – 40 ppm

Pro dospělou osobu je doporučena koncentrace 40 ppm, kdy aplikace by se prováděla pomocí mechanického rozprašovače několika vstřiky do dutiny ústní, cca 5 až 8 x denně.

Další variantou může být perorální aplikace, opět cca 5 až 8 x denně, v dávce á 10 ml s tím, že se koloidní stříbro podrží v ústech cca 3 – 5 minut a následně vyplivne.

Artritida – 20 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm. Denní dávka pro dospělou osobu by měla být 2 x 10 ml, formou perorální aplikace, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem. Zároveň je doporučeno koloidní stříbro ihned nezapíjet, aby se nesnižoval tímto „ředěním“ jeho účinek. Doba podání bývá v tomto případě cca 2 až 3 týdny.

Zároveň je vhodné ošetřit pokožku v místě kloubů – aplikace se provádí lehkým nástřikem pomocí mechanického rozprašovače několikrát denně a nechá se zaschnout.

ASLO – 20 ppm

V případě zvýšené hladiny ASLO, která indikuje boj imunitního systému se streptokokovou infekcí, je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm.

Tato varianta je hraniční, i pro dlouhodobější aplikace, které mohou být v řádu 2 až 3 měsíců. Vyšší koncentrace – 30, 40 či 50 ppm by mohly znamenat zbytečně zvýšenou zátěž pro organismus.

Zmíněná varianta 20 ppm, která by byla podávána perorálně 2 x 10 ml denně (na lačno, cca 15 minut před jídlem, není vhodné ihned zapíjet), dokáže postupně pročistit celý organismus a navrátit imunitní systém do původní rovnováhy.

Atopický ekzém – 30 ppm + 10 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm sprej pro zevní ošetření pokožky, kdy 3 až 4 x denně se provádí lehký nástřík daného místa, který se nechá zaschnout.

Zároveň pro podporu této aplikace je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 10 ppm aplikované perorálně, kdy denní dávka by měla být 2 x 10 ml. Tímto způsobem je postupně pročišťován celý organismus a celkově posílen imunitní systém.

Na místě je však nutné upozornění, že u atopického ekzému či lupénky, je úspěšnost působení koloidního stříbra 50:50 – u některých uživatelů bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, u jiných bohužel došlo „pouze“ ke stabilizaci stavu, bez výraznějšího zlepšení..

Bércový vřed – 30 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, kdy aplikace se provádí lehkým nástříkem 2 – 3 x denně na dané místo pomocí mechanického rozprašovače a nechá se zaschnout. Je také možné provést zábal daného místa pomocí navlhčeného odličovacího tamponu, jednou denně, na cca 20 – 30 minut.

Dále lze toto ošetření podpořit perorální aplikací koloidního stříbra v koncentraci 10 ppm, v dávce 2 x 10 ml denně. Dobu, po kterou by bylo nutné takto koloidní stříbro aplikovat je obtížné stanovit, nicméně v podobných případech je doporučena doba 2 až 4 týdnů.

Borelióza Lymská – 20 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm, kdy denní dávka, pro dospělou osobu, by měla být 3 až 4 x 10 ml, formou perorální aplikace, ideálně na lačno, cca 10 -15 minut před jídlem. Takto podané koloidní stříbro není vhodné ihned zapíjet – tímto „ředěním“ by se mohl snížit jeho účinek.

Doba podání je v tomto případě delší, cca 2 – 3 měsíce.

Bronchitida – 20 ppm

V tomto případě, pro dospělou osobu, je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm, které se aplikuje pomocí nosního spreje 3 x denně, několik vstříků na nosní díрку. v denní dávce 2 x 10 ml, ideálně na lačno, cca 10 -15 minut před jídlem.

Pro podporu této aplikace je vhodné perorální použití koncentrace 20 ppm, v denní dávce 2 x 10 ml. Tímto způsobem bude postupně pročišťován celý organismus a celkově posílen imunitní systém.

Crohnova nemoc – 20 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm. Denní dávka pro dospělou osobu by měla být 3 x 10 ml, formou perorální aplikace, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem. Takto podané koloidní stříbro není vhodné ihned zapíjet – tímto „ředěním“ by se mohl snížit jeho účinek.

Doba podání bývá v tomto případě cca 2 až 3 týdny, ve výjimečných případech až 6 měsíců.

Deodorant / Antiperspirant – 20 ppm

Částice Koloidního stříbra redukuje bakteriální mikroflóru a omezuje rozklad potu na daných místech pokožky – funkce Deodorantu. Zároveň jsou vhodné pro částečné omezení, nikoliv zabránění, nadměrné tvorby potu – funkce Antiperspirantu.

Pro ošetření pokožky je vhodné koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm, kdy aplikace se provádí lehkým

nástříkem pomocí mechanického rozprašovače 2 až 3 x denně a nechá se zaschnout.

Dále lze toto ošetření – jeho účinek, podpořit perorální aplikací Koloidního stříbra v koncentraci 10 ppm, v dávce 2 x 10 ml denně, ideálně na lačno, cca 10 -15 minut před jídlem. Takto podané koloidní stříbro není vhodné ihned zapíjet – tímto „ředěním“ by se mohl snížit jeho účinek.

Desinfekce vody – 10 ppm

Nejstarším doloženým použitím stříbra pro zdravotní účely je desinfekce vody. Díky schopnosti koloidního stříbra zabít škodlivé mikroorganismy, které se vyskytují a množí ve vodě, je takto ošetřená voda mnohem déle zdravotně nezávadná a tudíž vhodná i k pití.

Pro větší jistotu je však vhodné takto ošetřenou vodu analyzovat v kterékoliv hygienické stanici, pro potvrzení její nezávadnosti. Koloidní stříbro jako sanitizér vody využívají i profesionální vojenské jednotky v rámci svých bojových misí.

Doporučené dávkování: 1 ml koloidního stříbra koncentrace 10 ppm na 1 litr vody. V případech, kdy je voda silně kontaminovaná, například uhynulým zvířetem, je možné použít variantu 30 ppm.

Chlamydie (trachomatis / Pneumoniae / Psittaci) – 20 ppm

Mezi nejčastěji vyskytujícími se druhy této bakteriální nákazy patří Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae či Chlamydia psittaci.

V prvním případě (trachomatis) je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm, které se aplikuje perorálně 3 x 10 ml denně, po dobu cca 2 – 3 týdnů.

V druhém případě (pneumoniae) je vhodná aplikace pomocí nosního spreje 3 x denně několik vstříků na jednu nosní dírku + perorální aplikace 2 x 10 ml denně, po dobu cca 2 – 3 týdnů.

V třetím případě (psittaci) se provádí perorální aplikace až 5 x 10 ml denně, nejméně po dobu jednoho týdne.

Perorálně podané koloidní stříbro není vhodné ihned zapíjet – tímto „ředěním“ by se mohl snížit jeho účinek.

Chronická obstrukční plicní nemoc – 20 ppm

V případě tohoto onemocnění není mnoho zkušeností, ale pokud budeme vycházet z toho, že v případě onemocnění chronickou obstrukční plicní nemocí jsou největším problémem zánětlivé procesy, je doporučeno pro dospělou osobu koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm.

Aplikace se provádí jak pomocí nosního spreje – 3 x denně několik vstříků na jednu nosní dírku + perorální aplikace 2 x 10 ml denně, po dobu cca 2 – 8 týdnů (doba aplikace je značně individuální).

Chřipka – dospělí – 40 ppm

Pokud se nakazíte chřipkou, je koloidní stříbro vhodným prostředkem pro její léčbu. Působením na chřipkový virus dokáže koloidní stříbro odstranit původce choroby nikoliv jen její příznaky.

Pro dospělou osobu je určeno koloidní stříbro v koncentraci 40 ppm, kdy aplikace by se prováděla perorálně, 4 až 6 x denně s tím, že by se Koloidní stříbro podrželo v ústech cca 3 – 5 minut a následně vyplivlo. Pokud by se 1 či 2 dávky následně polkly, nehrozí žádné vedlejší účinky.

Dále je možné provádět zevní ošetření pokožky (tváře, ruce apod.) lehkým nástříkem pomocí mechanického rozprašovače.

Po ustoupení příznaků nemoci snižte dávku na 2 x 10 ml denně po dobu dalších cca 4 až 5 dnů. Pijte dostatečné množství tekutin, alespoň pak 2 l denně pro důkladné vyplavení patogenů.

Inhalace – 10 nebo 20 ppm

K inhalaci je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 10 ppm pro děti a dospívající, pro dospělé osoby varianta 20 ppm. Inhalace postačí 1 x denně, po dobu cca 5 až 10 minut.

Juvenilní idiopatická artritida – 5 nebo 10 ppm + 20 ppm

V tomto případě je doporučeno pro děti od 6 do 10 let koloidní stříbro v koncentraci 5 ppm, pro děti od 11 let výše koloidní stříbro 10 ppm.

Denní dávka by měla být 2 x 5 ml, formou perorální aplikace, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem. Koloidní stříbro není vhodné ihned zapíjet, tímto „ředěním“ by se mohl snížit jeho účinek. Doba podání bývá v tomto případě cca 2 až 4 týdny.

Zároveň by bylo vhodné ošetřit pokožku lehkým nástřikem v místě kloubů koncentrací 20 ppm několikrát denně. Případně je možné provést 1 x denně zábal stejnou koncentrací, po dobu cca 20 až 30 minut.

Lupénka – 30 + 10 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, kdy 2 – 3 x denně by se provedl lehký nástřik daného místa pomocí mechanického rozprašovače, který se nechá zaschnout. Zároveň pro podporu této aplikace je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 10 ppm aplikované perorálně, kdy denní dávka pro dospělé osobu by byla do 3 x 10 ml.

Tímto způsobem by byl postupně pročišťován celý organismus – posílila by se tak správná funkce imunitního systému.

Na místě je však vhodné upozornění, že u lupénky je úspěšné působení Koloidního stříbra 50:50 – u některých pacientů jsou velmi kladné ohlasy, u jiných bohužel, došlo „pouze“ ke stabilizaci stavu, bez výraznějšího zlepšení..

Ošetření je také vhodné podpořit aplikací ošetřující masti s koloidním stříbrem, která se nanáší 2 – 3 x denně.

Upozornění – nejdříve místa ošetřete koloidním stříbrem, následně mastí, ne naopak. Mast by pokožku „uzavřela“ a koloidní stříbro by tak nebylo dostatečně účinné.

Molusky – 30 ppm

V případě tohoto virového onemocnění je doporučena aplikace koloidního stříbra v koncentraci 30 ppm, které se nanáší 3 – 4 x denně na postižené místo a nechá se zaschnout.

Pro tento účel můžete použít buď mechanický rozprašovač pro lehký nástřik, nebo lze aplikovat pomocí navlhčeného odličovacího tampónu – pozor, aby se ošetřované místo příliš mechanicky nenamáhalo.

Jelikož tato koncentrace patří již mezi silnější varianty, kontrolujte, zda nedochází k vysoušení kůže v místech, kde se koloidní stříbro aplikovalo – četnost ošetření by se musela snížit. Doba aplikace koloidního stříbra je značně individuální, je doporučena cca 2 – 3 týdny.

MRSA – 30 + 20 ppm

V případě MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) je pro dospělé osobu doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, kdy aplikace by se prováděla pomocí nosního spreje v množství 1 vstřík na jednu nosní díрку, a to 4 – 5 x denně (v mnoha případech je ložisko v horních cestách dýchacích).

Zároveň je vhodné perorální podání koloidního stříbra v koncentraci 20 ppm, v denní dávce 2 – 3 x 10 ml, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem.

Dobu podání lze v těchto případech obtížněji stanovit, ale je doporučeno minimálně 14 dnů.

Mykózy povrchové – 40 ppm

Velkou část naší populace trápí různé mykózy a další plísňová onemocnění. Jsou způsobeny houbovými mikroorganismy a dalšími bakteriemi. Koloidní stříbro je díky svým účinkům schopno tyto potíže vyřešit.

Proti povrchové mykóze je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 40 ppm, které se aplikuje lehkým nástřikem pomocí mechanického rozprašovače na daná místa, s následným vmasírováním. Toto ošetření je vhodné provést 2 až 3 x denně, doba aplikace je značně individuální, může se pohybovat v rozpětí 2 týdnů až 2 měsíců. Důležitá je taktéž pravidelnost aplikace – její přerušení na několik dnů v podstatě znamená návrat na samotný začátek.

Pro podporu této aplikace je vhodné perorální použití koncentrace 20 ppm, v denní dávce 2 x 10 ml. Tímto způsobem bude postupně pročišťován celý organismus a celkově posílen imunitní systém.

Mykózy nehtové – 50 nebo 70 ppm

V případě mykózy (i opravdu velmi těžké a dlouhodobého charakteru) je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 50 ppm sprej, kdy aplikace se provádí lehkým nástřikem 2 – 3 x denně + zabal daného nehtu/ů, pomocí navlhčeného odličovacího tampónu, jednou denně, na cca 20 – 30 minut. Zároveň je nutné ošetření vnitřního prostoru obuvi lehkým nástřikem a následné odpočnutí obuvi dalších 24 hodin.

Pro podporu této aplikace je vhodné perorální použití koncentrace 20 ppm, v denní dávce 2 x 10 ml. Tímto způsobem bude postupně pročišťován celý organismus a celkově posílen imunitní systém.

Celá procedura by se měla provádět po dobu minimálně 3 týdnů (někdy je tato doba i delší), kdy viditelné výsledky se dostavují, při opravdu pravidelné aplikaci, již během prvních dnů.

Koncentraci 50 ppm je také možné nahradit silnější variantou 70 ppm.

Oční kapky – 5 nebo 10 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 5 ppm pro děti a dospívající, pro dospělé varianta 10 ppm.

Ze začátku je vhodné ošetřit bezprostřední okolí očí a víček lehkým otřením, aby se likvidovala bakteriální nákaza v těchto místech, po dobu cca 2 – 3 dnů. Teprve poté by případně následovala aplikace, která by měla být dostatečně účinná již při tomto dávkování: 1 kapka / 1 oko / 1 den.

Přímá aplikace do očí je doporučena po dobu jednoho týdne, poté by se doslova uvidělo, do jaké míry Koloidní stříbro zabralo a zda bude nutné s aplikací ještě pokračovat.

Opar – 50 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 50 ppm, kdy aplikace se provádí 4 – 5 x denně – stačí nanést buď lehkým nástřikem pomocí mechanického rozprašovače, nebo „naťupáním“ navlhčeným odličovacím tamponem a nechá se zaschnout.

Dále je možné toto ošetření podpořit perorální aplikací koloidního stříbra v koncentraci 15 ppm, v dávce 2 x 10 ml denně.

Doba, po kterou je nutné užití Koloidního stříbra je velmi individuální, většinou se pohybuje v řádu jednoho týdne.

Pásový opar – 30 ppm

Pokud jste postiženi nepříjemným pásovým oparem nebo pocítíte jeho příznaky, koloidní stříbro Vám může pomoci.

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm sprej pro zevní ošetření pokožky, kdy 3 – 4 x denně by se provedl lehký nástřik daného místa, který se nechá zaschnout.

Dále lze toto ošetření – jeho účinek, podpořit perorální aplikací Koloidního stříbra v koncentraci 20 ppm, v dávce 2 x 10 ml denně. Doba, po kterou je nutné užití Koloidního stříbra je velmi individuální, většinou se pohybuje v rozmezí 2 až 4 týdnů.

Pokud pásový opar nepropukne přímo, užívejte udržovací dávku 10 ml koloidního stříbra 20 ppm denně, po dobu cca 14 dnů.

Růže – Rosacea – Růžovka – Erysipel – 30 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, kdy aplikace se provádí lehkým nástřikem pomocí mechanického rozprašovače 2 – 3 x denně, na umytou a hlavně suchou pokožku v místě výskytu a jeho okolí.

Dále lze toto ošetření – jeho účinek, podpořit perorální aplikací koloidního stříbra v koncentraci 20 ppm, v dávce 2 x 10 ml denně, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem.

Dobu podání lze v těchto případech obtížněji stanovit, ale je doporučeno minimálně 14 dnů.

Seborea – 30 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, kdy aplikace se provádí lehkým nástřikem pomocí mechanického rozprašovače 2 – 3 x denně, na umytou a hlavně suchou pokožku v místě výskytu a jeho okolí.

Dále lze toto ošetření – jeho účinek, podpořit perorální aplikací koloidního stříbra v koncentraci 20 ppm, v dávce 2 x 10 ml denně, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem.

Dobu podání lze v těchto případech obtížněji stanovit, ale je doporučeno minimálně 14 dnů.

Ústní hygiena – Afty – kandida v ústech – 30 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30, maximálně 40 ppm, které by se aplikovalo 5 – 6 x denně pomocí mechanického rozprašovače několika vstřiky na problematické místo.

Po aplikaci není vhodné ihned požívat nápoje – došlo by k odplavení koloidního stříbra a snížení účinku ošetření.

Ústní hygiena – prevence – 15 ppm

Pro běžné ošetření, případně pro prevenci při sklonech k častějším zánětlivým onemocněním ústní dutiny, je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 15 ppm, v dávce 10 ml pro jednu aplikaci. Po vyklotání po dobu cca 1 až 2 minut se následně vyplivne.

Ústní hygiena – Zánět dásní – 30 ppm

Pokud Vás postihl zánět dásní nebo bolest zaníceného zubu, můžete využít koloidní stříbro přímo k boji se zánětem.

Pro ošetření zánětlivého onemocnění ústní dutiny je vhodné koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, v dávce 10 ml pro jednu aplikaci, která by se prováděla 4 – 5 x denně. Ideální je Koloidní stříbro podržet v ústech na několik minut a jazykem „vmasírovávat“ v daném místě.

Délka aplikace by se prováděla po dobu 1 týdne, v případě preventivního doléčení je doporučeno užívat dávku 1 x denně 10 ml po dobu dalšího týdne až dvou.

Pozor: zánět dásní nebo zubů je velmi závažným onemocněním a je nutno vždy navštívit lékaře!

Ústní hygiena – Extrakce zubu – 30 ppm

Pro ošetření zubního lůžka je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, v dávce 10 ml pro jednu aplikaci, která by se prováděla 2 – 3 x denně. Ideální je koloidní stříbro podržet v ústech na

několik minut, případně jazykem velmi opatrně „vmasírovávat“ – velmi opatrně platí zejména pro první dny po zákroku, kdy dochází k uzavírání okrajů extrakční rány a místo je velmi citlivé na jakékoliv mechanické namáhání.

Délka aplikace by měla být 2 týdny, v případě preventivního doléčení je doporučeno užívat dávku 1 x denně 10 ml, po dobu dalších 2 až 4 týdnů.

Výplach tlustého střeva – klystýr – 10 ppm

Při výplachu tlustého střeva (lidově klystýr) je vhodné vodu na klystýr ošetřit pomocí koloidního stříbra. Tím se provede její desinfekce a zajistí zdravotní nezávadnost. Pro tento účel je vhodné koloidní stříbro v koncentraci 10 ppm, případně 20 ppm, v množství 10 ml na 1 litr vody.

Záněty horních cest dýchacích – děti a dospívající – 10 ppm

Infekce horních cest dýchacích nebo také nachlazení jsou způsobeny mikroorganismy způsobujícími zánětlivá onemocnění. Převážná většina těchto mikroorganismů patří do skupiny těch, které koloidní stříbro likviduje.

Pro děti a dospívající je určeno koloidní stříbro v koncentraci 10 ppm. Aplikuje se pomocí nosního spreje 2 – 3 x denně, vždy jeden vstřík na jednu nosní díрку.

Pro podporu této aplikace by bylo vhodné perorální použití koncentrace 10 ppm, v denní dávce 2 x 5 ml, která celý proces, díky celkovému pročištění organismu, dokáže značně urychlit..

Po ustoupení příznaků pokračujte s udržovací dávkou 1 x 5 ml denně aplikovaných perorálně, až do úplné úlevy.

Záněty horních cest dýchacích – dospělí – 30 ppm

Infekce horních cest dýchacích nebo také nachlazení jsou způsobeny mikroorganismy způsobujícími zánětlivá onemocnění. Převážná většina těchto mikroorganismů patří do skupiny těch, které koloidní stříbro likviduje.

Pro dospělé osobu je určeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm. Aplikuje se pomocí nosního spreje 2 – 3 x denně, vždy jeden vstřík na jednu nosní díрку.

Pro podporu této aplikace je vhodné perorální použití koncentrace 30 ppm, v denní dávce 2 x 10 ml, která celý proces, díky celkovému pročištění organismu, dokáže značně urychlit..

Po ustoupení příznaků pokračujte s udržovací dávkou 1 x 10 ml denně aplikovaných perorálně, až do úplné úlevy.

Záněty močového měchýře a močových cest – 20 ppm

Infekce močového měchýře a močových cest je značně bolestivé. Koloidní stříbro pomáhá odstranit záněť a tak značně ulevit.

Denní dávka pro dospělé osobu by měla být 3 – 4 x denně á 10 ml – takto rozdělené dávkování bude působit šetrněji a efektivněji. Aplikuje se vždy na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem. Doba užívání Koloidního stříbra je značně individuální, ale je doporučena v délce 14 dnů.

Záněty vaginální a kvasinkové infekce – 20 ppm

V případě vaginálních zánětů, kvasinkových infekcí, mykóz a podobných obtíží, jsou velmi dobré reference od uživatelů na koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm.

Tímto roztokem by se prováděl výplach 2 – 3 x týdně, po dobu minimálně 14 dnů. Vhodný aplikátor

je od přípravku Rosalgin, kdy nádobka by se plnila množstvím 100 – 150 ml koloidního stříbra, v neředěné formě.

Pro podporu této aplikace by bylo vhodné perorální použití koncentrace 20 ppm, v denní dávce 2 x 10 ml, která celý proces, díky celkovému pročištění organismu, dokáže značně urychlit.

Zápach nohou – 30 ppm

V případě ošetření nohou při zvýšeném pocení a nadměrnému zápachu, je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 30 ppm, kdy aplikace se provádí lehkým nástřikem 2 – 3 x denně – lze aplikovat jak přímo na pokožku nohou, tak i na ponožky.

Zároveň je vhodné ošetřit vnitřní prostor obuvi lehkým nástřikem stejnou koncentrací a obuv nechat „odpočinout“ dalších 24 hodin.

Celá procedura by se měla provádět po dobu minimálně 14ti dnů, kdy výsledky se dostavují, při opravdu pravidelné aplikaci, již během prvních dnů.

Zlatý stafylokok – 20 ppm

V tomto případě je doporučeno koloidní stříbro v koncentraci 20 ppm. Denní dávka, pro dospělou osobu, by měla být 2 až 3 x 10 ml, formou perorální aplikace, ideálně na lačno, cca 10 – 15 minut před jídlem. Takto podané koloidní stříbro není vhodné ihned zapít – tímto „ředěním“ by se mohl snížit jeho účinek. Doba podání bývá v tomto případě cca 14 dnů.

Zároveň by bylo vhodné ošetřit pokožku stejnou koncentrací, kdy aplikace by se prováděla lehkým nástřikem pomocí mechanického rozprašovače, několikrát denně a nechalo by se zaschnout.

20 denní čistící kúra – 10 ppm

Mnoho lidí zaznamenalo velký nárůst fyzické a psychické energie poté, co absolvovali tzv. 20 denní čistící kúru.

Během této kúry dochází k pročištění organismu od patogenů. Pro zvýšení a urychlení efektivity se po dobu trvání kúry nedoporučuje nadměrná konzumace masa, ryb, vajec, výrobků chemicky konzervovaných a průmyslově ultrazpracovaných potravin. Je vhodné se také vyhnout alkoholu a cigaretám.

V průběhu trvání celé kúry se doporučuje pít nejméně 1 litr minerální vody denně a obecně dodržovat řádný pitný režim. Doporučuje se též pít podmáslí pro obnovu střevní mikroflóry, nebo užívat probiotika a prebiotika.

Doporučené dávkování:

1. až 5. den: 1 x 10 ml
6. až 10. den: 2 x 10 ml
11. až 15. den: 3 x 10 ml
16. až 20. den: 4 x 10 ml

Příklady dalšího použití koloidního stříbra jako doplněk léčby:

Chřipka a její pandemické mutace, rýma, záněty mandlí – angíny, vředy, svědění análního otvoru, zánět slepého střeva, kapavka, úplavice, hemoroidy, vydatné bílé výtoky, zánět močového měchýře, otrava způsobená působením toxinů v krvi, záškrt, zánět nadvarlat, zarděnky, artritida, zánět pohrudnice, sepse, revma, cholera, cukrovka, opar, zánět stafylokokem, nákaza streptokokem, žaludeční záněty, syfilis, střevní potíže, malárie, kvasinková nákaza, krevní paraziti, zánět mozkových blan, nachlazení, zánět tračnicku, hypertrofie prostaty, zápal plic, břišní tyfus.

Koloidní zlato, využití a dávkování

Mezi hlavní oblasti využití účinků koloidního zlata patří následující kategorie obtíží:

- léčba depresivních a úzkostných stavů,
- léčba závislostí (na alkoholu, nikotinu, lécích, drogách, jídle, apod.),
- řešení obtíží s klouby (dna, revma, artritida),
- zlepšení cévního a oběhového systému,
- normalizace krevního tlaku a srdečních obtíží,
- zlepšení paměti a inteligence (dle studií lze dočasně zvýšit IQ až o dvacet bodů),
- zlepšení stavu při roztroušené skleróze a dalších degenerativních onemocněních mozku,
- řešení spánkových obtíží a poruch,
- udržení mladistvé, čisté a pružné pokožky.

Dávkování koloidního zlata

Vnitřní užívání: Vždy na lačný žaludek, cca 10 – 15 minut před jídlem, dospělá osoba 5 ml denně, děti a dospívající poloviční dávka (Koloidní zlato by nemělo přijít do dlouhodobého styku s kovem, nepoužívejte proto pro jeho dávkování kovové lžičky a zejména uchovávání kovové nádoby). Po užití hned nezapíjejte, aby se nesnižoval účinek.

Vnější užívání: místní ošetření pokožky, kloubů, apod. Naneste koloidní zlato pomocí tampónu nebo sprejem na ošetřované místo a nechejte zaschnout.

Výše uvedené informace jsou v rozporu s předpisy a nařízeními EU a jsou Vám sdělovány jako příklad, na základě osobních zkušeností předchozích uživatelů, jejich blízkých osob, nebo byly čerpány z veřejně dostupných informačních zdrojů.